

Met ingang van 1 juli 2023 zijn in Medicom de volgende wijzigingen aangebracht:

NIEUWE PRODUCTEN

Met deze taxen zijn 325 geneesmiddelen toegevoegd aan het medicatiebewakingsbestand en voorzien van medicatiebewaking.

NIEUWE GENERIEKE STOFFEN

De volgende nieuwe generieke stoffen zijn toegevoegd aan het bestand en voorzien van medicatiebewaking:

MELFALAN FLUFENAMIDE
MIRIKIZUMAB
VERICIGUAT

ALGEMENE WIJZIGING

Cenobamaat en bosentan zijn niet meer als standaard enzyminductor opgenomen. Enkel bij interacties waarbij direct bewijs voor een effect op het substraat bekend is, worden beide middelen nog bewaakt.

Ceritinib en tucatinib, zijn beoordeeld als sterke CYP3A4-remmer, osilodrostat als zwakke remmer. Deze middelen zijn, waar van toepassing, opgenomen in interacties omtrent enzymremming.

Osilodrostat is daarnaast ook opgenomen als zwakke CYP2D6- en CYP1A2-remmer. Deze middelen zijn tevens opgenomen in het overzicht van CYP-remmers en -inductoren.

NIEUWE INTERACTIES

IA 537 lenacapavir – overige middelen
IA 838 sonidegib – CYP3A4-remmers

GEWIJZIGDE BEWAKING BIJ IA

Bij de interacties met digoxine zijn de risicofactoren uitgebreid van alleen hypokaliëmie naar elektrolytstoornissen.

Bij de volgende interacties is de bewaking aangepast:

IA 4 VKA's – antibiotica: sulfametrol is verwijderd uit deze IA en opgenomen in IA 95 co-trimoxazol – VKA's.

IA 123 doxycycline – enzyminductoren: eravacycline is toegevoegd.

IA 291 proteïnekinaseremmers – CYP3A4-remmers: nirmatrelvir/ritonavir is toegevoegd.

IA 303 bosentan – CYP3A4-remmers: nirmatrelvir/ritonavir is toegevoegd.

- IA 314, 315 acalabrutinib tabletten zijn verwijderd.
- IA 437 abirateron – enzyminductoren: darolutamide is toegevoegd.
- IA 506 saquinavir – overige middelen: finerenon en zanubrutinib zijn toegevoegd.
- IA 512 nevirapine – overige middelen: capmatinib, deflazacort, finerenon, lenacapavir en zanubrutinib zijn toegevoegd. Dexmethyfenidaat en methyfenidaat zijn verwijderd.
- IA 516 efavirenz – overige middelen: capmatinib, deflazacort, finerenon, lenacapavir en zanubrutinib zijn toegevoegd. Dexmethyfenidaat en methyfenidaat zijn verwijderd.
- IA 517 lopinavir+ritonavir – overige middelen: zanubrutinib, finerenon en capmatinib zijn toegevoegd.
- IA 519 atazanavir – overige middelen: capmatinib, finerenon, lenacapavir en zanubrutinib zijn toegevoegd.
- IA 526 etravirine – overige middelen: capmatinib, deflazacort, finerenon, lenacapavir en zanubrutinib zijn toegevoegd. Dexmethyfenidaat en methyfenidaat zijn verwijderd.
- IA 529 elvitegravir + cobicistat – overige middelen: capmatinib, finerenon, lenacapavir en zanubrutinib zijn toegevoegd. Fluconazol is verwijderd.
- IA 530 cobicistat – overige middelen: capmatinib, finerenon, lenacapavir en zanubrutinib zijn toegevoegd. Fluconazol is verwijderd.
- IA 534 doravirine – overige middelen: lumacaftor is toegevoegd.
- IA 536 fostemsavir – overige middelen: lumacaftor is toegevoegd.

VERVALLEN INTERACTIES

- IA 345 antimicrobiële middelen – biologicals
IA 607 ombitasvir/paritaprevir/ritonavir – overige geneesmiddelen
IA 726 cabergoline – domperidon
IA 822 olaparib – enzyminductoren en IA 804 venetoclax – enzyminductoren.

Deze interacties zijn samengevoegd met IA 395 proteasoomremmers – enzyminductoren.

NIEUWE CONTRA-INDICATIE

- CI 126 pulmonale hypertensie is voorzien van bewaking. Dopamine, diltiazem en verapamil zijn toegevoegd aan deze CI.

GEWIJZIGDE BEWAKING CI

- CI 2 epilepsie is verwijderd bij roxadustat.
- CI 13 lang-QT-interval-syndroom is toegevoegd aan dexmedetomidine, relugolix, remdesivir, tebentafusp en voclosporine. Perflutren is verwijderd.
- CI 17 jicht is verwijderd bij analgetische salicylaten. Het advies voor antitrombotische salicylaten is aangepast.
- CI 22 hypothyreoidie: de bewaking is uitgebreid naar alle proteïnekinaseremmers.
- CI 26 myasthenie is verwijderd bij de fenothiazines en clotiapine. Het advies voor de interferonen is gewijzigd.
- CI 28 veneuze trombose is verwijderd bij tranexaminezuur en dienogest.
- CI 29 depressie is verwijderd bij anti-epileptica.
- CI 33 nierfunctiestoornissen: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
- CI 59 kindervens man is toegevoegd aan tamsulosine, opioïden, hormonen en antihormonen, sirolimus en antivirale middelen bij HCV.
[Voor meer achtergrondinformatie zie het nieuwsbericht >>](#)
- CI 70 slaapapneu: de adviestekst van ticagrelor is gewijzigd.
- CI 74 hersenbloeding is verwijderd bij piracetam.
- CI 79 open trommelvlies: het advies voor bacicoline-B oordruppels is gewijzigd.
- CI 96-99 zwangerschap en borstvoeding: adviezen zijn geüpdatet naar geüpdatete informatie van Moeders van Morgen.
- CI 101 verkeersdeelname: er zijn specifieke adviezen beschikbaar voor of adviezen zijn aangepast bij scopolamine pleisters, amivantamab en difelikefalin.
- CI 102 contactlenzen: het advies is gewijzigd voor oogdruppels zonder conserveermiddel. Eerder waren er twee verschillende adviezen met 3 en 15 minuten, dit is nu aangepast naar enkel het advies om de lenzen tot 3 minuten na het druppelen uit te laten.
- CI 106-107 dialyse: adviezen zijn geüpdatet.
- CI 116 morbide obesitas: de adviestekst is gewijzigd bij anticonceptiva, gentamicine en ciprofloxacin.
- CI 117 bariatrische chirurgie is toegevoegd aan TCA's, MAO-remmers, bupropion en orale rehydratiezouten.
[Voor meer achtergrondinformatie zie nieuwsbericht >>](#)

De adviestekst voor antidepressiva en DOAC's is gewijzigd.

- CI 122 mastocytose/mestcelactivatiesyndroom is toegevoegd aan atracurium, mivacurium, rocuronium en thiopental.
- CI 68 heet vanaf nu "verhoogd bloedingsrisico" in plaats van "stollingsstoornis".
- CI 574-576 zullen per 12-2023 vervallen.
[Zie voor meer achtergrondinformatie het nieuwsbericht >>](#)

GEWIJZIGDE BEWAKING PD

- PD 359 fosfaatbinders is komen te vervallen vanwege onvoldoende klinische relevantie.
- PD 360 diuretica: acetazolamide en mannitol zijn verwijderd.

VERVALLEN OV

OV perubalsem is vervallen, omdat er geen geneesmiddelen meer in de handel zijn die perubalsem bevatten.

NIEUWE DOSEERCODES

Op verzoek zijn de volgende doseercodes toegevoegd aan de centrale doseercodetabel:

- | | |
|-------|---|
| 34.ZA | 3 tot 4 keer per dag zalf aanbrengen. |
| 34CAB | 3 tot 4 keer per dag crème aanbrengen. |
| 3M23T | niet meer dan 3 keer per dag 2 tot 3 tabletten. |
| 3MCAB | niet meer dan 3 keer per dag crème aanbrengen. |
| 3MW1C | niet meer dan 3 keer per week 1 capsule. |
| 3MW1T | niet meer dan 3 keer per week 1 tablet. |
| 3MZAB | niet meer dan 3 keer per dag zalf aanbrengen. |
| 3ZCAB | zo nodig 3 keer per dag crème aanbrengen. |
| 3ZZAB | zo nodig 3 keer per dag zalf aanbrengen. |
| 3ZZML | zo nodig 3 keer per dag 7,5 milliliter. |
| 9D1BG | 9 keer per dag 1 druppel in elk oog. |
| D3HZK | 1 keer per 3 dagen een half zakje. |
| M CAB | in de ochtend crème aanbrengen. |
| M3KT | ochtend: 3 en een kwart tablet. |
| N GAB | voor de nacht gel aanbrengen. |
| N ZAB | voor de nacht zalf aanbrengen. |
| NZCAB | voor de nacht zo nodig crème aanbrengen. |
| NZZAB | voor de nacht zo nodig zalf aanbrengen. |